

Экспертные решения для диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также для улучшения памяти и концентрации внимания

ХОФИТОЛ®

Защищает печень, улучшает ток желчи. Оригинальный препарат из Франции²⁵



Таблетки №60

РУ № П.Н003.320/01 от 30.03.2023



Таблетки №180

РУ № П.Н003.320/01 от 30.03.2023



Раствор 120 мл

РУ № П.Н003.320/02 от 27.03.2023 Хофитол®

Показания¹

- Комплексная терапия дискинезий желчевыводящих путей по гипокINETическому типу¹
- Хронический некалькулезный холецистит¹
- Хронический нефрит¹
- Хроническая почечная недостаточность¹
- Хронический гепатит¹
- Цирроз печени¹

Способ применения¹

Таблетки: Взрослым по 2–3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 6 лет по 1–2 таблетки 3 раза в день до еды. Курс лечения – 2–3 недели.

Раствор: Препарат принимают внутрь, до еды, разбавляя в небольшом количестве воды.

Взрослым: по 2,5–5,0 мл раствора 3 раза в сутки. Курс лечения – 2–3 недели.

Детям: препарат назначают в дозе, составляющей от ¼ до ½ дозы, применяемой у взрослых¹.

МЕТЕОСПАЗМИЛ®

Выгодное предложение при боли в животе, вздутии, нарушениях стула²³



Капсулы №30

РУ № П.Н003.069/01 от 08.11.2020



Капсулы №60

РУ № П.Н003.069/01 от 08.11.2020

Показания²

- Функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся болями в животе, повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их чередованием²
- Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости²

Способ применения²

Внутрь. По 1 капсуле 2–3 раза в сутки перед едой.

При подготовке к исследованию органов брюшной полости – по 1 капсуле 2–3 раза накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования.

Длительность терапии определяется врачом индивидуально².

ТАНАКАН®

Оригинальный препарат для симптоматического лечения – улучшает память и концентрацию внимания^{15, 16}



Таблетки 40 мг №30

РУ ЛП-№(002951)-(Р)-РУ от 11.04.2023 Танакан®



Таблетки 40 мг №90

РУ ЛП-№(002951)-(Р)-РУ от 11.04.2023 Танакан®



Раствор для приема внутрь 40 мг/мл

РУ ЛП-№(002075)-(Р)-РУ от 30.03.2023 Танакан®

Показания¹⁶

- Симптоматическое лечение когнитивных нарушений (ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и интеллектуальных способностей)¹⁶
- В составе комплексной терапии головокружения вестибулярного происхождения в качестве вспомогательного лечения в дополнение к вестибулярной реабилитации¹⁶
- Симптоматическое лечение звона или шума в ушах (тиннитуса)¹⁶

Способ применения¹⁶

Танакан® таблетки: 3 таблетки в день, распределенные в течение дня. Курс лечения составляет не менее 3 месяцев¹⁶.

Танакан® раствор: по 1 дозе (1 мл) 3 раза в сутки, во время еды. Курс лечения составляет не менее 3 месяцев¹⁶.

ПРОБИОЛОГ® СРК

Специальный пробиотик при СРК и хронических расстройствах ЖКТ⁵

Капсулы №15



СРП № RU.7.99.11.003.R.004658-12.21 от 07.12.2021

Показания⁵

- При синдроме раздраженного кишечника (СРК)⁵
- При СРК-подобных симптомах: боли, вздутии, метеоризме, запоре или диарее⁵

Способ применения⁵

Взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день во время еды (можно вскрыть капсулу и высыпать содержимое в негорячую пищу).

Продолжительность приема – 3–6 недель. При необходимости прием можно повторить⁵.

ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ

Усиленная концентрация для интенсивного восстановления микрофлоры^{4, 24}

Капсулы №30



СРП № RU.7.99.11.003.R.004678-12.21 от 07.12.2021

Показания⁴

- Во время и после приема антибиотиков⁴
- При расстройствах стула с диареей⁴
- При приеме ингибиторов протонной помпы⁴

Способ применения⁴

Взрослым и детям старше 7 лет по 1–2 капсулы в день во время еды (можно вскрыть капсулу и высыпать содержимое в негорячую пищу).

Продолжительность приема – 10–30 дней. При необходимости прием можно повторить⁴.

ПРОБИОЛОГ®

Базовая концентрация для восстановления баланса микрофлоры^{3, 24}

Капсулы №30



СРП № RU.7.99.88.003.R.004677-12.21 от 07.12.2021

Показания³

- При несбалансированном питании³
- Во время и после ограничительных диет³
- После приема антибиотиков³

Способ применения³

Взрослым и детям старше 7 лет по 1–3 капсулы в день во время еды (можно вскрыть капсулу и высыпать содержимое в негорячую пищу)³.

Продолжительность приема – 10–30 дней. При необходимости прием можно повторить³.

ЛИНЕЙКА ПРОБИОЛОГ® – БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

СМЕКТА® ПАСТА

При диарее удобно взять, быстро принять¹³

Карамель-какао Паста для приема внутрь 3 г №8



РУ № ЛП-003401 от 24.08.2022

Показания¹⁴

- Лечение острой диареей у детей старше 2 лет в дополнение к пероральной регидратации и у взрослых¹⁴
- Симптоматическое лечение хронической функциональной диареей у взрослых¹⁴
- Симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых¹⁴

Способ применения¹⁴

При лечении острой диареей: Внутрь, не требует разведения водой. Предпочтительно принимать между приемами пищи.

Взрослым по 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Детям старше 2 лет: по 2 пакетика в сутки. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Длительность лечения определяется врачом индивидуально¹⁴.

СМЕКТА®

Помогает останавливать и лечить диарею за счет тройного удара¹¹



РУ № ЛП.001855/01 от 04.03.2020

Ваниль Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г №20



РУ № ЛП.001855/01 от 04.03.2020

Апельсин Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г №20



РУ № ЛП.001855/01 от 04.03.2020

Клубника Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г №30

Показания¹²

- Лечение острой диареей у детей старше 2 лет в дополнение к пероральной регидратации и у взрослых¹²
- Симптоматическое лечение хронической функциональной диареей у взрослых¹²
- Симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых¹²

Способ применения¹²

При лечении острой диареей: Внутрь, перед применением следует приготовить суспензию. Предпочтительно принимать между приемами пищи.

Взрослым по 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Детям старше 2 лет: по 2 пакетика в сутки. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Длительность лечения определяется врачом индивидуально¹².

ЭЗИКЛЕН®

Однолитровый препарат с удобным приемом и высоким качеством очищения кишечника^{7, 8}



РУ № ЛП-004957 от 29.06.2021

Концентрат для приготовления раствора для приема внутрь

Показания⁷

- Для очищения толстой кишки у взрослых пациентов при подготовке к эндоскопическому и радиологическому исследованию толстой кишки или к хирургическим вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке⁷

Способ применения⁷

Взрослые. Для надлежащего очищения кишечника требуется прием двух флаконов препарата Эзиклен®. Перед приемом содержимое каждого флакона необходимо развести водой. Пациент должен выпить полученный разведенный раствор и еще две чашки, наполненные до метки водой или разрешенной прозрачной жидкостью (т.е. приблизительно 1 л), в течение следующих двух часов. В общей сложности, для очистки кишечника перед проведением процедуры необходимо выпить не менее 3 л жидкости. Препарат принимают либо в режиме дробного применения (первый флакон принимается вечером накануне процедуры, а второй – на следующее утро), либо в режиме единовременного применения (прием накануне процедуры).

Препарат Эзиклен® может приниматься:

- в режиме дробного применения (двухэтапно)
- в режиме единовременного применения (одноэтапно) – одноэтапно утром в день колоноскопии, если процедура назначена на 14:00 и позже – одноэтапно вечером накануне дня колоноскопии, если процедура назначена до 14:00

Для более точного расчёта времени приёма раствора препарата Эзиклен® можно позвонить на «Горячую линию Майоли по подготовке к колоноскопии» или воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта времени приёма: www.eziclen.info



Прием полного объема разведенного раствора препарата Эзиклен® и дополнительного количества воды или прозрачной жидкости должен быть закончен как минимум за 2 часа и не позднее 4 часов до начала процедуры.

- ✓ Что такое колоноскопия, как она проходит и как нужно правильно подготовиться к ней?
- ✓ Что такое колоректальный рак и почему важна его своевременная диагностика?
- ✓ Как правильно подготовиться к колоноскопии с помощью препаратов Эзиклен® или Фортранс®?

Если у Вас появились эти и другие вопросы, позвоните


НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

по подготовке к колоноскопии препаратами компании МАЙОЛИ

ФОРТРАНС®

Когда четыре литра раствора имеют значение¹⁰

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь



РУ № ЛП.001430/01 от 30.06.2022

Показания⁹

- Очищение толстой кишки при подготовке пациента к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки, оперативным вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке⁹

Способ применения⁹

Внутрь. Взрослые. Содержимое одного пакетика высыпать в 1 л воды и хорошо размешать до полного растворения. Рекомендуемая доза составляет 1 пакетик/1 л раствора на 15–20 кг массы тела пациента или, в среднем, от 3 до 4 л полученного раствора. Рекомендуется выпивать по одному полному стакану (250 мл) полученного раствора препарата каждые 15 мин до полного употребления приготовленного объема раствора. Полную дозу можно разделить на два приема: 2 л вечером и от 1 до 2 л на следующее утро. Обычно рекомендуется последний прием препарата завершить не позднее, чем за 3 ч до проведения обследования или хирургического вмешательства (первый жидкий стул должен появиться в течение 1–2 часов после начала приема препарата)⁹.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ:

Позвоните на горячую линию
8 800 7000 164
(круглосуточно без выходных)
Звонок бесплатный



WhatsApp



Telegram

Напишите в чат на номер
8 969 207 0164
(круглосуточно без выходных)

**НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЕДИНЫ
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ**

ПЕПСАН-Р®

Не имеющий аналогов по составу в РФ²⁶
рецептурный препарат для лечения ГЭРБ
и функциональных расстройств ЖКТ
с изжогой, отрыжкой⁶



Гель №14



Гель №30

Показания⁶

- Гастралгия, ГЭРБ 0-1 степени⁶
- Повышенная кислотность желудочного сока⁶
- Функциональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся повышенным газообразованием, отрыжкой, изжогой, тошнотой, запорами, диареей или их чередованием⁶
- Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости⁶

Способ применения⁶

Внутрь. По 1 саше 2-3 раза в сутки перед едой (курс лечения определяется индивидуально), либо в случае возникновения боли. При подготовке к исследованиям органов брюшной полости – по 1 саше 2-3 раза накануне исследования и 1 саше утром в день исследования⁶.

ФОРЛАКС®

Относится к препаратам первой линии
терапии запора¹⁷⁻¹⁹, помогает надолго
восстановить естественную работу
кишечника²⁰⁻²²



Порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
4 г №20



Порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
10 г №20

Показания^{21,22}

- Симптоматическое лечение запоров у детей
в возрасте от 6 месяцев и у взрослых^{21,22}

Способ применения^{21,22}

Форлак® 4 г (детская форма):

Внутрь. Содержимое одного пакетика следует растворить примерно в 50 мл воды и принимать утром (если дозировка – 1 пакетик в день), либо принимать утром и вечером (если дозировка – более 1 пакетика в день).

- с 6 месяцев до 1 года: 1 пакетик в день.
- с 1 года до 4 лет: от 1 до 2 пакетиков в день.
- с 4 до 8 лет: от 2 до 4 пакетиков в день.

Продолжительность лечения – не более 3 месяцев.

Форлак® 10 г (взрослые и дети с 8 лет):

Внутрь. Содержимое каждого пакета следует растворить в 50 мл воды непосредственно перед приемом. Содержимое 1-2 пакетиков (10-20 г), предпочтительно, в виде однократного приема по утрам или по 1 пакету (утром и вечером) в случае приема 2 пакетов в день.

Рекомендуемый курс лечения – 3 месяца^{21,22}.

1. ИМП Хофитол®, таблетки, покрытые оболочкой от 30.03.2023. ИМП Хофитол®, раствор для приема внутрь от 27.03.2023. 2. ИМП Метеоспазмил®, капсулы от 05.11.2020. 3. Листок-вкладыш БАД к пище ПробиоЛог®. 4. Листок-вкладыш БАД к пище ПробиоЛог® форте. 5. Листок-вкладыш БАД к пище ПробиоЛог® СРК. 6. ИМП Пепсан-Р®, гель для приема внутрь от 30.03.2023. 7. ИМП Эзиклен®, концентрат для приготовления раствора для приема внутрь от 07.02.2022. 8. Дуглас К. Рекс и др. Рандомизированное клиническое исследование «Сравнение малообъемного перорального раствора сульфатов со стандартным 4-литровым раствором макроглола для подготовки к колоноскопии» // Gastrointestinal Endoscopy. Vol. 72, № 2. 2010. 9. ИМП Фортранс®, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 64 г от 30.08.2022. 10. Хассан Чезаре и др. Подготовка кишечника к колоноскопии: руководство Европейского общества эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ESGE) – обновление 2019 // Endoscopy. – 2019. – Т. 51. № 8. С. 775–794. 11. «Тройной удар по диарее» – на основании механизма действия препарата Смекта®: адсорбция, укрепление естественного барьера кишечника и облегчение боли. 12. ИМП Смекта®, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [апелсинный, ванильный, клубничный], 3 г от 30.08.2022. 13. По сравнению с порошком Смекта® для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г. 14. ИМП Смекта®, паста для приема внутрь, 3 г от 24.08.2022. 15. Дамулин И.В. Имвентан Танакана® (EGb 761) в неврологической практике. РМЖ. 2009;5:335. 16. ЛВ Танакан®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг от 11.04.2023. ЛВ Танакан®, раствор для приема внутрь, 40 мг/мл от 30.03.2023. 17. Виттон В. и др. Клинические рекомендации Французского национального общества колопроктологов по лечению хронических запоров. Eur. J. Gastroenterol Hepatol. 2018. Т. 30. № 4. С. 357–363. 18. Клинические рекомендации МЗ РФ «Запор» 2021 года. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/facomend/274_2. 19. Булатов В.П., Камалова А.А., Шакирова А.Р., Сознинова А.А. Современные рекомендации по ведению детей с функциональным запором // Рос. вестн. перинатол. и педиатр. 2015. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-rekomendatsii-po-vedeniyu-detej-s-funktsionalnym-zaporom> (дата обращения: 07.06.2022). 20. Дюпон К. и др. Двойное слепое рандомизированное исследование по оценке клинической и биологической переносимости полиэтиленгликоля 4000 по сравнению с лактулозой у детей с запорами // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2005. Т. 41. № 5. С. 625–633. 21. ИМП Форлак®, порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей], 4 г от 10.01.2023. 22. ИМП Форлак®, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г от 10.01.2023. 23. Выгодное предложение, так как Метеоспазмил® может заменить покупку двух препаратов отдельно (спазмолитика и ветрогонного). 24. Ивашкин В.Т. и др. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение синдрома раздраженного кишечника // Колопроктология. 2022. Т. 21. № 1. С. 10–25. 25. Оригинальное лекарственное средство французского производства. 26. По данным ГРЛС. Дата обращения: май 2023 г.

Информация о медицинском продукте предоставляется работникам здравоохранения в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях предоставления населению информации об эквивалентных медицинских препаратах (по материалам работников здравоохранения или материалам, предоставленным населению работниками здравоохранения).

Контактная информация: ООО «Майюли Спиндлер», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17/23. Тел.: + 7 (495) 664-83-03. Электронная почта: vorogov@mayoly.ru. Сайт: www.mayoly-spincler.ru. ООО «Илсон КХК», 109147, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, д. 17-23. Тел.: +7 (495) 796-87-68, факс: 8 (495) 796-87-69. Сайт: www.mayoly-spincler.ru. Контактная информация для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях: pharmacovigilance.russia.chc@s.mayoly.com. Контактная информация для сообщения жалоб на качество продукта: qualitycomplaints.russia.chc@gs.mayoly.com.

ЕЗС-RU-001604-13112023

MAYOLY